

精巢捻転症は精巣鞘膜が正常より高い位置で精索に付着し、鞘膜の付着部を軸

精巣がねじれる捻転症

今回から3回に分け、急に陰のうが痛くなる「急性陰のう症」について解説していきます。(上)は思春期に多い「精巣捻転症」です。

で、急速かつ適切に診断と治療を行なうことになるため、思春期のお子さんをお持ちの保護者の方には「陰のうが

発症後すぐなら温存可

気づいたら病院へ

「もしや精巣捻転で」とかく精巣捻転症に勝負。迅速な手術につなげるためには、症状があ

泌尿器講座

急性陰のう症 (上)



いいい腎泌尿器科クリニック院長
石井 達矢

(いいい・たつや)1999年(平成11年)山形大学医学部卒業。同大附属病院、公立医療総合病院勤務などを経て2020年5月いいい腎泌尿器科クリニックを開業。医学博士、日本泌尿器科学会認定専門医・指導医、日本医師会認定産業医。

痛い時はすぐに泌尿器科がある病院へ」ということを知つておいて欲しいものです。

周囲の方は要注意です

ただ思春期の多感なお子さんは「陰のうが痛い」とは言えないことが多く、下腹部や股関節の痛みを訴える場合があるので要注意です。

また精巣捻転では吐き気を伴うこともあり、周囲が胃腸炎などと間違つて救急外来の受診をためらってしまうこともあります。

は陰のう切開して精巣の捻転を解除し、血流の回復を目指します。その後、精巣が再びねじれないと、陰のう内に縫い付けるというものです。発症から6~12時間以内に手術すれば精巣は温存できる可能性がありますが、時間がたつてしまふと精巣を摘除するしかなくなってしまいます。



その際は緊急手術に備え、食事はしないで受診することをお忘れなく。

れば休日だろうが夜中だろうが直ちに病院に駆けこむことが肝要です。

〈泌尿器科・内科〉

いいい腎泌尿器科クリニック

☎ 023-616-3601 山形市桜田西4-17-49

●診療時間
午前/9時00分~12時30分
午後/14時30分~18時00分

●休診日
木曜午後・土曜午後・日曜・祝祭日

